

# Skąd się biorą wady wymowy u dzieci?

**Przyczyny powstawania wad artykulacyjnych u dzieci mogą być wielorakie.**

Do najczęstszych zalicza się:

- niewłaściwy tor oddechowy – oddychanie przez usta;
- przetrwały niemowlęcy sposób połykania – utrwalone nieprawidłowe ułożenie języka, powstrzymuje język przed tzw. „pionizacją”;
- nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych, np. rozszczep podniebienia, zbyt krótkie wędzidełko języka;
- wady zgryzu;
- długotrwały nawyk ssania smoczka, picie z butelki ze smoczkiem lub ssanie palca;
- wady słuchu – nawet jeśli są to okresowe uszczerbki spowodowane przewlekłymi stanami kataralnymi lub przerostem trzeciego migdała;
- niewłaściwe wzorce w otoczeniu dziecka tzw. „mowa nianiek”, czy też nieprawidłowa artykulacja u osób najbliższych dziecku;
- uszkodzenia pracy ośrodkowego układu nerwowego;
- niedojrzałość funkcji słuchu fonemowego.

Każdy rodzic, który stwierdzi, że wymienione powyżej czynniki pasują do jego dziecka, może zacząć pracować z nim wcześniej i w ten sposób zapobiegać powstawaniu wad wymowy.